



사용 설명서

수이샷® 델타2

(SuiShot® DELTA-2)

1. 원료약품

- 가. *Mycoplasma hyopneumoniae*
- 나. *Haemophilus parasuis* serotype 4
- 다. *Haemophilus parasuis* serotype 5
- 라. *Immulant-a*
- 마. *Formalin*

2. 제형 및 성상

아이보리색의 투명한 액체로서 약간의 침전이 생길 수 있으나 흔들면 균등한 액체가 되며 이물, 이취가 없고 내용물의 성상이 균일하여야 한다.

3. 제조방법

-

4. 효능 및 효과

돼지유행성폐렴, 돼지글래씨씨병을 예방

5. 용법 및 용량

가. 접종방법, 접종부위 및 접종량

자돈 1차접종 : 생후 7일령 이상, 이근부근육, 1.0ml/두

2차접종 : 1차 접종 2주후, 이근부근육, 2.0ml/두

6. 포장단위

10ml, 20ml, 30ml, 50ml, 100ml

7. 저장방법 및 유효기간

- 가. 저장방법 : 2~7℃의 냉장소에 보관
- 나. 유효기간 : 제조일로부터 24개월

8. 주의사항

- 가. 반드시 건강한 돼지만 접종하십시오.
- 나. 백신 취급 전 후에는 손을 깨끗이 닦고 접종이 끝난 후에는 빈병과 사용한 도구는 폐기하십시오.
- 다. 반드시 사용 전에 백신 전체가 25℃ 전후의 온도가 되도록 유지한 후 사용하십시오.
- 라. 동결되었던 백신은 효력이 없으니 사용하지 마십시오.
- 마. 백신을 사용하기 전에 충분히 흔든 후 사용하십시오.
- 바. 백신은 직사광선을 피하십시오.
- 사. 주사기구는 1회용 또는 순수한 물로 끓여 사용하여야 하며, 1두 1침의 원칙을 지키십시오.
- 아. 쓰다 남은 백신은 잡균의 혼입이나 효력이 감퇴할 우려가 있으니 사용하지 마십시오.
- 자. 안정성 및 유효성에 변화를 초래할 수 있으므로 정하여진 저장방법을 준수하십시오.
- 차. 제본 제품의 효능은 인정되었으나 질병, 영양상태 및 환경불량 등의 스트레스 요인에 의해 면역반응이 저하될 수 있습니다.
- 카. 반드시 수의사의 지시에 따라 사용하십시오.
- 타. 기타 제품에 대한 문의사항은 제조회사 또는 판매업소로 연락하여 주십시오.

9. 시험기준 및 시험방법

국가검정 동물용의약품 생물학적제제 검정기준에 따른다.

10. 비고

국가검정 동물용의약품임.

중앙백신 연구소

042-863-9308
대전광역시 유성구 유성대로 1476-37