

사용 설명서

포울샷® 엠지-에프 (PoulShot® MG-F)

1. 원료약품 및 분량 (본제 1수분 중)

- 가. 닭 마이코플라즈마 배양액 (*Mycoplasma gallisepticum* F810)-----
-----1x10⁵CCU이상
나. 보호제-----정량

2. 제형 및 성상

- 가. 제형 : 생물학적제제
나. 성상 : 노란색 동결건조분말제제로 이물 이취가 없고 푸른색의 용해 용 용액을 가하여 흔들면 내용물의 성상이 균일함

3. 효능 및 효과

이 백신은 닭의 마이코플라즈마증(*Mycoplasma gallisepticum*)을 예방을 목적으로 사용

4. 용법 및 용량

- 가. 접종시기
6주령에 1차 접종하고 3주후 2차 접종
나. 접종방법
동봉된 희석액에 용해하여 0.03ml씩 점안접종
(본 백신 접종 전후하여 4주동안 뉴캐슬병, IB, FP 접종을 피하는 것이 좋으나 사독백신은 무관)

5. 포장단위

1,000수/병

6. 저장방법 및 유효기간

- 가. 저장방법 : 냉암소(2~8℃)에 보관
나. 용기종류 : 밀봉용기
다. 유효기간 : 제조일로부터 24개월

7. 주의사항

- 가. 다음 환축에게는 투여하지 말 것
1) 본제에 대한 쇼크나 과민반응이 있었던 닭에는 사용하지 마십시오.
2) 질병에 감염되었거나 잠복중인 닭, 열이 있거나 영양장애가 심한 닭, 전염성 질병 및 기생충 감염, 스트레스를 받은 닭, 곰팡이 및 세균의 독소 등에 의해 면역 기능이 저하된 닭에는 사용하지 마십시오.

나. 부작용

계군의 위생상태에 따라 간혹 백신접종 후에 식욕부진, 기침, 재채기, 산란율 저하등의 접종반응이 일어날 수 있으므로 주사 후 과민반응의 발현여부를 잘 관찰하시고 수의사 와 상담하여 항생제 및 영양제의 투여 등 적절한 처치를 하십시오.

다. 일반적 주의

- 1) 닭의 모체이행항체수준, 일령, 건강상태, 재접종 등의 조건에 따라 면역형성에 차이가 있으니 이를 고려하여 접종하십시오.
- 2) 본 제품은 동물용의약품이므로 사람에게 절대 사용하지 마시고 수의사의 지시에 따라 사용하십시오.
- 3) 사용설명서(주의사항)를 충분히 읽어본 후 사용하십시오.
- 4) 지정된 축종 이외에는 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않으므로 임의로 사용하지 마십시오.
- 5) 만일의 경우를 위하여 사용백신의 제조번호, 유효기간, 구입일, 백신접종일, 접종장소, 접종 후 반응 등을 정확히 기록하십시오.
- 6) 제품에 대해 문의하실 사항이나 기타 자세한 사항은 (주)중앙백신 연구소나 판매업소로 연락하여 주시기 바랍니다.

라. 적용상의 주의

- 1) 백신접종 7일전부터 접종 후 14일까지는 전신성 치료제 및 항생제 사용을 하지 마십시오.
- 2) 본제는 백신 접종 직전에 동봉된 점안용 희석액 (ILT백신 희석액도 사용가능)으로 용해한 후 1~2시간 이내에 사용하십시오.
- 3) 접종 전에는 반드시 백신의 성상 및 이물의 혼입여부 등을 관찰한 후 이상이 있으면 사용하지 마십시오.
- 4) 안전성 유효성에 문제를 일으킬 수 있으므로 다른 제제(백신, 항생제, 영양제 등)와 혼합하여 사용하지 마십시오.
- 5) 각종 스트레스 요인(환경변화, 사료변경, 수송 등)이 발생하였을 때는 접종을 피하는 것이 좋습니다. 최소한 접종 전 후 1주일간은 모든 스트레스 요인으로부터 보호하여야 합니다.
- 6) 취급자는 장갑, 마스크, 보호의 등 보호장비를 착용하여 직접적인 피부접촉이나 흡입을 피하여 주십시오.
- 7) 약품 취급 시 피부나 눈에 접촉되었을 경우는 즉시 깨끗이 씻어낸 후 이상증상이 발견되는 즉시 의사와 진료를 받으십시오.
- 8) 제조사에서 공급하는 점안용 멸균희석액 및 접종용기를 사용하십시오.

마. 저장상의 주의사항

- 1) 직사일광, 가온 또는 동결은 품질에 나쁜 영향을 미치므로 피하십시오.
- 2) 외관 및 내용상에 이상이 확인된 백신은 사용하지 마십시오.
- 3) 안전사고 방지를 위하여 어린이의 손이 닿지 않고 동물의 접근이 불가능한 곳에 보관하십시오.
- 4) 유효성 및 안전성에 변화를 초래할 수 있으므로 저장방법을 준수하십시오.
- 5) 유효기간이 경과된 제품은 사용하지 마시고 안전하게 폐기처리 하십시오.
- 6) 쓰고 남은 백신 및 사용한 백신용기는 안전하게 폐기하고 다른 용도로 사용하지 마십시오.

중앙백신 연구소

www.cavac.co.kr

☎042-863-9308

대전광역시 유성구 유성대로 1476-37

PI-106J-00