

포울샷®

QX Flu-4

IB 2종(KM91, QX형)+ND+AI
혼합 사독 오일백신POULTRY
VACCINE1000
수분/병

PoulShot®

○ 제명명 : 포울샷® 큐엑스 플루-4 (PoulShot® QX Flu-4)

○ 원료약품 및 분량 (본제 1수분 중)

가. 유효성분

불활화된 뉴캐슬병 바이러스 (NDV, LaSota주) 10^{8.0}EID₅₀ 이상

불활화된 닭전염성기관지염 바이러스 (IBV, KM91주)

..... 10^{6.0}EID₅₀ 이상

불활화된 닭전염성기관지염 바이러스 (IBV, ADL05258주)

..... 10^{6.0}EID₅₀ 이상불활화된 저병원성 조류인플루엔자 바이러스 (A/Chicken/Korea/01310/2001 (H9N2) CE20주) 10^{8.0}EID₅₀ 이상

나. 면역증강제

Cavant® WO-A1 70%

다. 보존제

Formalin 0.2% 이하

○ 제형 및 색상

가. 제형 : 생물학적 제제

나. 색상 : 백색의 유탕주사액으로서 정치하면 백신 내용물의 침전이 생기나 흔들면 쉽게 균등액이 되며 이물, 이취가 없음.

○ 효능 및 효과

닭의 뉴캐슬병·전염성 기관지염·저병원성 조류 인플루엔자 (H9N2형)의 예방을 목적으로 사용

○ 용법 및 용량

가. 접종시기 : 8~12주령 닭에 접종 후 14~18주령에 추가 접종.

나. 접종방법 : 본제 1수분 (0.5ml)을 근육 부위에 접종.

※ 뉴캐슬병 및 닭 전염성 기관지염 생백신을 기초 접종하였을 경우 더 좋은 효과를 볼 수 있다.

○ 포장단위

1,000수분/병

○ 저장방법 및 유효기간

가. 저장방법 : 냉장소 (2~8℃)에 보관

나. 용기종류 : 밀봉용기

다. 유효기간 : 제조일로부터 24개월

○ 주의사항

가. 다음 환축에게는 투여하지 말 것

1) 본제에 대한 쇼크나 과민반응이 있었던 닭에는 사용하지

2) 질병에 감염되었거나 잠복중인 닭, 열이 있거나 영양장애가

심한 닭, 전염성 질병 및 기생충 감염, 스트레스를 받은 닭, 곰팡이 및 세균의 독소 등에 의해 면역기능이 저하된 닭에는 사용하지 마십시오.

3) 육계에는 사용하지 마십시오.

나. 부작용

계군의 위생상태에 따라 간혹 백신접종 후에 식욕부진, 기침, 재채기, 산란을 저하 등의 접종반응이 일어날 수 있으므로 주사 후 과민 반응의 발현여부를 잘 관찰하시고 수의사와 상담하여 항생제 및 영양제의 투여 등 적절한 처치를 하십시오.

다. 일반적 주의

1) 닭의 일령, 건강상태, 생독 백신의 접종 등의 조건에 따라 면역 형성에 차이가 있으며, 검사를 통하여 면역력이 부족 하다고 판단될 시에 반드시 추가 접종하십시오.

2) 본 제품은 동물용의약품이므로 사람에게 절대 사용하지 마시고 수의사의 지시에 따라 사용하십시오.

3) 사용설명서 (주의사항)를 충분히 읽어본 후 사용 하십시오.

4) 지정된 축종 이외에는 안전성 및 유효성이 확립 되어 있지 않으므로 임의로 사용하지 마십시오.

5) 접종시기 산정 및 만일의 경우를 위하여 사용백신의 제조번호, 유효기간, 구입일, 백신 접종일, 접종장소, 접종 후 반응 등을 정확히 기록하십시오.

6) 약품 취급 시 피부나 눈에 접촉되었을 경우는 즉시 깨끗이 씻어낸 후 이상증상이 발견되는 즉시 의사의 진료를 받으십시오.

7) 제품에 대해 문의할 사항이나 기타 자세한 사항은 (주)중앙 백신연구소나 판매업소로 연락하여 주시기 바랍니다.

라. 적용상의 주의

1) 백신을 사용 전에 충분히 흔들어 내용액을 균일하게 한 후 사용하십시오.

2) 사용 전, 본 백신을 더운 물에 잘 진탕하여 약 25℃ 전후가 되도록 하여 사용하십시오. 사용 중에도 가끔 따뜻하게 진탕해 주십시오.

3) 멸균된 주사기구를 사용하여 1수 1침을 원칙으로 사용하십시오.

4) 취급자는 장갑, 마스크, 보호의 등 보호장비를 착용하여 직접적인

피부접촉이나 흡입을 피하여 주십시오.

5) 백신 용기의 고무마개를 70% 알코올 솜으로 소독하여 건조한 후 백신액을 흡여 주사시 혈관에 들어가지 않도록 주의 하십시오.

6) 개봉하여 주사침을 찔렀던 백신은 신속히 사용하며, 사용하고 남은 백신은 집군의 혼입, 효력저하의 우려가 있으므로 사용하지 마십시오.

7) 백신을 손이나 손가락에 잘못 주사한 경우, 염증과 동통이 발생할 수 있어 즉시 백신액을 흡입하여 체외로 빼내야 합니다. 라벨, 설명서 또는 포장지에 기재되어 있는 성분표를 외과의사에게 보여주고 상담과 진찰을 받으십시오.

8) 각종 스트레스 요인 (환경변화, 사료변경, 수송 등)이 발생 하였을 때는 접종을 피하는 것이 좋습니다. 최소한 접종 전 후 1주일간은 모든 스트레스 요인으로부터 보호하여야 합니다.

9) 환경이 불량하거나 주사 부위가 오염된 경우에는 주사부위에 염증 및 화농이 생길 수 있으므로 주사부위를 70% 알코올 등으로 깨끗이 소독한 후 사용하십시오.

마. 저장상의 주의사항

1) 직사일광, 가온 또는 동결은 품질에 나쁜 영향을 미치므로 피하십시오.

2) 외관 및 내용상에 이상이 확인된 백신은 사용하지 마십시오.

3) 안전사고 방지를 위하여 어린이의 손이 닿지 않고 동물의 접근이 불가능한 곳에 보관하십시오.

4) 유효성 및 안전성에 변화를 초래할 수 있으므로 저장방법을 준수하십시오.

5) 유효기간이 경과된 제품은 사용하지 마시고 안전하게 폐기처리 하십시오.

6) 쓰고 남은 백신 및 사용한 백신용기는 안전하게 폐기하고 다른 용도로 사용하지 마십시오.

○ 제조원

중앙백신 연구소

대전광역시 유성구 유성대로 1476-37