

사용 설명서

보비샷® 대장균-P
(BoviShot® EC-P)

1. 원료의 조성성분 및 분량

가. 유효성분

° 대장균 Pilus 정제액 -----40%

나. 면역증강제

° Oil Adjuvant(Mineral Oil, Aracel A, tween80)-----60%

2. 성상

백색의 유탁액으로 장기간 정치하여도 분리층이 형성되지 않아야 하며,
이물 이취가 없고 성상이 균일하여야 한다.

3. 용법 및 용량

가. 임신한 소 또는 양에 분만 8주전과 2-3주전, 2회 각 2ml씩 경부근
육에 접종한다.

나. 기초면역된 소 또는 양은 매 임신기마다 분만 2-3주전에 2ml씩 1회
접종한다.

4. 효능 및 효과

송아지 및 새끼양의 대장균성 설사 예방에 사용한다.

5. 포장단위

1두분

6. 저장방법 및 유효기간

저장방법 : 2~8℃의 냉암소에 저장

유효기간 : 제조일로부터 12개월간 유효하다.

7. 주의사항

가. 사용 전에 사용설명서를 충분히 참조하십시오.

나. 수의사의 처방이나 지시에 따라 사용하십시오.

다. 건강한 소에만 접종하십시오.

라. 백신병을 충분히 흔들어 내용물을 균일하게 한 후 사용하십시오.

마. 멸균주사기를 사용하며 주사바늘은 1두 1침의 원칙을 지키십시오.

바. 백신은 직사광선을 피하십시오.

사. 쓰다 남은 백신은 잡균의 혼입 또는 효력이 감퇴할 우려가 있으니
보관 후 재사용하지 말고 위생적으로 폐기하십시오.

아. 스트레스 요인이 발생하였을 때는 접종을 피하는 것이 좋습니다.
최소한 접종 전 후 1주일간은 모든 스트레스 요인으로부터 보호하
여야 합니다.

자. 사용 전에 백신이 25℃전후로 한 후 사용하십시오.

차. 동결되었던 백신은 효력이 없으니 사용하지 마십시오.

카. 자세한 사항은 제조회사 또는 판매업소에 문의하십시오.