

사용 설명서

수이샷® 티알
(SuiShot® TR)

1. 원료약품 및 분량 (본제 1두분 당)

가. 유효성분

- ° 돼지 전염성위장염 감염 배양액(TGEV, 평택주)-----
----- 10^{4.0}TCID₅₀/dose이상(30%)
- ° 돼지 로타 바이러스 감염 배양액(PRV, A주)-----
----- 10^{6.0}TCID₅₀/dose이상(20%)

나. 첨가제

- ° 트레할로오스, 인산이수소칼륨, 인산수소이칼륨,
L-글루탐산나트륨, 젤라틴

2. 제형 및 성상

가. 제형: 생물학적제제

나. 성상: 회백색의 건조괴로서 이물, 이취가 없고 내용물의 성상이 균일하여야 한다.

3. 효능 및 효과

돼지 전염성위장염 및 로타바이러스 감염에 의한 설사증을 예방

4. 용법 및 용량

가. 접종시기 및 접종방법

- 1) 초임돈: 분만 5~6주전 및 분만 3주전에 각각 2ml씩 경구투여 후
분만 1주전에 본제 2ml 근육접종
- 2) 경산돈: 분만 2~3주전 경구투여와 근육접종을 각각 본제 2ml씩
동시에 실시
- 3) 자돈: 이유 후 1주 이내에 2ml을 경구투여

5. 포장단위

5두분

6. 저장방법 및 유효기간

- 가. 저장방법: 2~8℃ 냉장소에 저장
- 나. 용기종류: 밀봉용기
- 다. 유효기간: 제조일로부터 24개월

7. 주의사항

가. 다음 환축에게는 투여하지 말 것

대상동물이 중대한 질병과 관련된 경우, 백신접종을 피하십시오.

나. 다음 환축에게는 신중히 투여할 것

- 1) 가벼운 발열, 설사 등의 이상증상이 확인된 것.
- 2) 질병치료 중이거나 치료 직후 시간적 간격이 부족한 경우.
- 3) 뚜렷한 영양장애가 있는 경우.

다. 부작용

- 1) 접종 후 일과성의 발열, 원기소실, 식욕부진을 나타낼 수 있습니다.
- 2) 접종 후 14일 이내에는 접종부위에 반흔이 남아있을 수 있으므로
출하 예정 14일 이내의 동물에는 접종하지 마십시오.

라. 일반적 주의

- 1) 반드시 건강한 동물에만 접종하십시오.
- 2) 본 제품은 동물용의약품이므로 사람에게 절대 사용하지 마시고
수의사의 지시에 따라 사용하십시오.

중앙백신 연구소
www.cavac.co.kr

☎ 042-863-9308
대전광역시 유성구 유성대로 1476-37

SI-105D-03

- 3) 사용설명서(주의사항)를 충분히 읽어 본 후 사용하십시오.
- 4) 지정된 동물 이외에는 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않으므로 임의로 사용하지 마십시오.
- 5) 접종시기 산정 및 만일의 경우를 위하여 사용백신의 제조번호, 유효기간, 구입일, 백신접종일, 접종장소, 접종 후 반응 등을 정확히 기록하십시오.
- 6) 취급자는 장갑, 마스크 및 보호의 등 보호장비를 착용하여 약물의 직접적인 피부접촉이나 흡입을 피하여 주십시오.
- 7) 약품 취급 시 피부나 눈에 접촉되었을 경우는 즉시 깨끗이 씻어낸 후 이상증상이 발견되는 즉시 의사의 진료를 받으십시오.
- 8) 제품에 대해 문의하실 사항이나 기타 자세한 사항은 (주)중앙백신연구소나 판매업소로 연락하여 주시기 바랍니다.

마. 임신 또는 수유 중인 동물, 신생 또는 어린 동물, 쇠약한 동물에 대한 투여

임신 또는 수유 중인 동물, 신생 또는 어린 동물, 쇠약한 동물에 투여 시 수의사와 상의하여 사용하십시오. 임신 중인 경우 특히 주의하여 사용하십시오.

바. 적용상의 주의

- 1) 본제는 백신 접종 직전에 용해하며 용해한 백신은 충분히 섞은 후 바로 사용하십시오.
- 2) 멸균된 주사기와 주사바늘을 사용하며 1두 1침을 원칙으로 사용하십시오.
- 3) 백신 접종 시 안전을 위해 두꺼운 장갑 등을 착용하십시오.
- 4) 희석액과 백신액을 뽑을 때, 용기의 고무마개를 70% 알코올 등으로 소독하여 건조한 후 뽑으며 접종 시 혈관에 들어가지 않도록 주의하십시오.
- 5) 사용 후 보관하였던 백신은 세균의 혼입으로 면역형성이 저하되므로 재사용하지 마십시오.
- 6) 약품 취급 시 피부나 눈에 접촉되었을 경우는 즉시 씻어내고 이상증상이 나타나는 즉시 의사의 진료를 받으십시오.
- 7) 각종 스트레스 요인 (환경변화, 사료변경, 수술 등)이 발생하였을 때는 접종을 피하는 것이 좋습니다. 최소한 접종 전후 1주일간은 모든 스트레스 요인으로부터 보호하여야 합니다.

사. 저장상의 주의사항

- 1) 직사일광, 가온 또는 동결되었던 백신은 효력이 없으니 사용하지 마십시오.
- 2) 안전사고 방지를 위하여 어린이의 손이 닿지 않고 동물의 접근이 불가능한 곳에 보관하십시오.
- 3) 유효성 및 안전성에 변화를 초래할 수 있으므로 저장방법을 준수하십시오.
- 4) 유효기간이 경과된 제품은 사용하지 마시고 안전하게 폐기처리 하십시오.
- 5) 빈 용기나 포장지는 안전하게 폐기하고 다른 용도로 사용하지 마십시오.
- 6) 외관 및 내용상에 이상이 확인된 백신은 사용하지 마십시오.