

사용 설명서

수이샷® 돈열단독 (SuiShot® CSF+SE-Live)

1. 원료약품 및 분량(본제 1두분 중)

가. 유효성분

- 돼지 열병바이러스 조직배양 세포배양 감염액 (CSFV, LOM주)40%
- 돼지단독균 배양액 (*Erysipelothrix rhusiopathiae*, NL-11주) (4×10⁸CFU이상).....40%

나. 첨가제

- 트레할로오스, 인산이수소칼륨, 인산수소이칼륨, L-글루탐산나트륨, 젤라틴

2. 제형 및 성상

가. 제형 : 생물학적제제

나. 성상 : 회백색 건조괴이며 이물 이취가 없고 내용물의 성상이 균일 하여야 한다.

3. 효능 및 효과

돼지열병 및 돼지단독의 예방

4. 용법 및 용량

가. 접종시기

- 1) 자돈: 1차 40일령 (5~6주령)
2차 60일령 (8~9주령)
- 2) 번식돈(모돈·웅돈): 매년 1회

나. 접종방법

- 1) 용제로 희석하여, 1mL씩 근육주사
- 2) 농장의 여건에 따라 자돈 접종법외에 초유 전 예방접종법 (신생 자돈이 첫 젖을 먹기 전 접종)을 적용할 수 있다.

5. 포장단위

10두분, 50두분

6. 저장방법 및 유효기간

가. 저장방법 : 2~8℃의 냉암소에 저장

나. 용기종류 : 밀봉용기

다. 유효기간 : 제조일로부터 24개월

7. 주의사항

가. 접종상의 주의

- 1) 반드시 건강한 돼지에만 접종합니다.
- 2) 임신돈에는 접종하지 마십시오.
- 3) 반드시 멸균된 주사기구를 사용합니다.
- 4) 희석액과 백신액을 뽑을 때, 용기의 고무마개를 70% 알코올 솜으로 소독하여 건조한 후 뽑으며 주사시에는 혈관에 들어가지 않도록 주의하십시오.
- 5) 백신은 열에 대한 저항력이 약하므로 용해용 용액으로 용해한 후 1시간을 초과하지 않도록 하여야 합니다.
- 6) 주사바늘은 1마리마다 바꾸어 주십시오.
- 7) 백신접종 후 적어도 1~2일간은 안정시키고 이동이나 심한 운동을 피하도록 해주십시오.
- 8) 백신 주사전 3일간, 주사후 7일간의 항균제의 사용은 면역형성에 지장을 줄 수 있으므로 사용을 금합니다.

나. 대상동물이 중대한 질병과 관련된 경우, 백신접종을 피하십시오.

다. 다음 동물에는 신중하게 접종하십시오.

- 1) 가벼운 발열, 설사 등의 이상증상이 확인된 것
- 2) 질병치료 중이거나 치료 직후 시간적 간격이 부족한 경우
- 3) 뚜렷한 영양장애가 있는 경우

라. 주사 후 일시적인 발열, 원기소실, 식욕부진을 나타낼 수 있습니다.

마. 취급상의 주의

- 1) 직사일광, 가온 또는 동결은 품질에 나쁜 영향을 미치므로 피하십시오.
- 2) 개봉하여 주사침을 찔렀던 백신은 신속히 사용하며, 사용하고 남은 백신은 잡균의 혼입, 효력저하의 우려가 있으므로 사용하지 마십시오.

3) 외관 및 내용상에 이상이 확인된 백신은 사용하지 마십시오.

4) 쓰고 남은 백신 및 사용한 백신용기는 안전하게 폐기하십시오.

5) 백신을 손이나 손가락에 잘못 주사한 경우, 염증과 동통이 발생할 수 있으니 즉시 백신액을 흡입하여 체외로 빼내야 합니다. 라벨, 설명서 또는 포장지에 기재되어 있는 성분표를 외과의사에게 보여주고 상담과 진찰을 받습니다.

바. 수의사의 처방이나 지시에 따라 사용하십시오.

사. 기타 자세한 사항은 (주)중앙백신연구소나 판매업소에 문의하십시오.

CSF+SE-Live
SI-114EI-02

CSF+SE-Live
SI-114EI-02

중앙백신 연구소

www.cavac.co.kr

☎ 042-863-9308

대전광역시 유성구 유성대로 1476-37

SI-114EI-02